

3

SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

📌 Résumé

Nous créons ici un catalogue de suites numériques usuelles. Les suites arithmétiques, qui modélisent des croissances linéaires, et les suites géométriques, pour des croissances exponentielles, sont toutes désignées.

1 Suites arithmétiques

Définition

Soient $r \in \mathbf{R}$ et (u_n) une suite numérique définie sur \mathbf{N} par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

(u_n) est appelée **suite arithmétique** de **raison** r .

Exemples ► Les deux suites suivantes sont arithmétiques, respectivement de raison de 2,3 et -1 :

$$\begin{cases} u_0 = 12 \\ u_{n+1} = u_n + 2,3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{N} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_0 = 10 \\ v_{n+1} = v_n - 1 \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{N} \end{cases}$$

► Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 3 et de premier $u_0 = -5$.


Alors, $u_1 = u_0 + 3 = -5 + 3 = -2$. De même, $u_2 = u_1 + 3 = 1$. On peut continuer indéfiniment : $u_3 = 4, u_4 = 7, u_5 = 10, \dots$

Propriété


Une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est arithmétique de raison r et de premier terme u_0 si, et seulement si, pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

Exemple Représentons la suite arithmétique (u_n) de raison 2 et de premier terme 3.



La forme explicite de (u_n) est : $u_n = 2n + 3$ si $n \in \mathbf{N}$. Il est ainsi cohérent de constater que les représentations de (u_n) et de la fonction affine f d'expression $f(x) = 2x + 3$ coïncident sur \mathbf{N} .



Théorème | Termes consécutifs

x , y et z sont trois **termes consécutifs** d'une suite arithmétique si $\frac{x+z}{2} = y$.

Propriété | Somme des premiers termes

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .
On peut calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$ la somme des $n+1$ premiers termes par la formule suivante :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n+1)$$

Exemple Calculons $S = 1 + 3 + 5 + \dots + 21$. Cette somme correspond à la somme des 11 premiers termes de la suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 1.

$$S = \frac{1+21}{2} \times 11 = 11^2 = 121.$$

Remarque On peut calculer la somme des entiers de 1 à n pour $n \in \mathbf{N}^*$ grâce à la propriété précédente. Ainsi,

$$1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2 Suites géométriques

Définition

Soient $q \neq 0$ et (u_n) une suite numérique définie sur \mathbf{N} par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

(u_n) est appelée **suite géométrique de raison q** .


Exemple Soit (u_n) une suite géométrique de raison 2 et de premier $u_0 = 1,3$. Alors, $u_1 = 2 \times u_0 = 2 \times 1,3 = 2,6$. De même, $u_2 = 2 \times u_1 = 5,2$. On peut continuer indéfiniment : $u_3 = 10,4$, $u_4 = 20,8$, $u_5 = 41,6$, ...

Propriété

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est géométrique de raison q et de premier terme u_0 si, et seulement si, pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Exemple Représentons la suite géométrique (u_n) de raison 1,2 et de premier terme 0,5.



Théorème | Termes consécutifs

x , y et z **positifs** sont trois **termes consécutifs** d'une suite géométriques si $\sqrt{xz} = y$.

Propriété | Somme des premiers termes

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 .
On peut calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$ la somme des $n+1$ premiers termes par la formule suivante :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Exemple Calculons $S = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2048$. Cette somme correspond aux 12 premiers termes d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 1.

$$\text{Ainsi, } S = \frac{1 - 2^{12}}{1 - 2} = \frac{1 - 4096}{1 - 2} = 4095.$$