

# DEVOIR SURVEILLÉ 1 B

Calculatrice autorisée

Mercredi 24 septembre 2025

## EXERCICE 1 (12 POINTS)

1. On a réalisé 900 lancers d'un dé à 4 faces.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	200	220	210	270

Déterminer la médiane de cette série. **Détails attendus.**

2. Le tableau suivant indique le nombre de buts marqués par 32 joueurs d'une équipe de football au cours d'une saison :

Buts marqués	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Effectif	3	4	5	6	4	3	3	2	2

Calculer la moyenne et l'écart type de cette série. **Détails attendus.**

3. On effectue des mesures sur une exploitation agricole qui vend des melons. On a pesé plusieurs melons choisis au hasard :

Masse (en g)	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
Effectif	3	5	8	12	18	20	10	4

- a) Combien de melons ont été pesés ?
- b) Comparer les proportions de melons de masse strictement supérieure à 1300 g et de masse strictement inférieure à 1300 g.
- c) La récolte est considérée comme conforme si :
- l'étendue des masses est inférieure à 400 g;
  - la médiane vaut 1300 g;
  - la moyenne  $\bar{x}$  vaut 1300 g à 20 g près;
  - au moins 90% des melons sont dans l'intervalle  $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$  où  $\sigma$  est l'écart type des masses.

Que peut-on conclure quant à la conformité de la récolte ?

## CORRECTION

1. On a  $N = 900$  lancers.

Cumul des effectifs : 200; 420; 630; 900

Le rang médian est  $N/2 = 450$ . On constate que  $420 < 450 \leq 630$ , donc la médiane correspond à la valeur 3.

Médiane = 3

2. Effectif total :  $N = 32$ .

**Calcul de la moyenne :**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i n_i}{N} = \frac{0 \times 3 + 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 + 4 \times 4 + 5 \times 3 + 6 \times 3 + 7 \times 2 + 8 \times 2}{32}$$

$$\sum x_i n_i = 0 + 4 + 10 + 18 + 16 + 15 + 18 + 14 + 16 = 111$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{111}{32} \approx 3,47$$

**Calcul de l'écart type :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{32} \left( 3(0 - 3,47)^2 + 4(1 - 3,47)^2 + 5(2 - 3,47)^2 + 6(3 - 3,47)^2 + 4(4 - 3,47)^2 + 3(5 - 3,47)^2 + 3(6 - 3,47)^2 + 2(7 - 3,47)^2 + 2(8 - 3,47)^2 \right)}$$

$$\sigma \approx \sqrt{5,15} \approx 2,27$$

$$\bar{x} \approx 3,47 \quad \text{et} \quad \sigma \approx 2,27$$

3. a) Nombre total de melons :

$$N = 3 + 5 + 8 + 12 + 18 + 20 + 10 + 4 = 80$$

- b) Masse strictement < 1300 g :  $3 + 5 + 8 + 12 = 28$  melons soit  $\frac{28}{80} \sim 35\%$ . Masse strictement > 1300 g :  $20 + 10 + 4 = 34$  melons soit  $\frac{34}{80} \sim 42,5\%$ .

$$42,5\% > 35\%$$

Il y a donc davantage de melons de masse supérieure à 1300 g.

- c) Vérifions les critères de conformité :

- Étendue :  $1450 - 1100 = 350 < 400$
- Médiane : le rang médian est 40. Cumul des effectifs : 3; 8; 16; 28; 46; 66; 76; 80. Le 40<sup>e</sup> melon se trouve dans la classe de masse 1300 g.
- Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1100 \cdot 3 + 1150 \cdot 5 + 1200 \cdot 8 + 1250 \cdot 12 + 1300 \cdot 18 + 1350 \cdot 20 + 1400 \cdot 10 + 1450 \cdot 4}{80}$$

$$\bar{x} = \frac{105250}{80} = 1315,6 \text{ g}$$

Écart à 1300 g :  $|1315,6 - 1300| = 15,6 < 20$

- Écart type :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{N}} \approx 96,4 \text{ g}$$

Intervalle :


$$[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma] = [1122,8; 1508,4]$$

Toutes les masses (de 1100 à 1450 g) appartiennent à cet intervalle. Cela représente 100% des melons, donc supérieur à 90%.

Tous les critères sont remplis : la récolte est conforme.

**EXERCICE 2 (8 POINTS)**

On a tracé ci-dessous les courbes de quatre fonctions affines  $f_1, f_2, f_3$  et  $f_4$ . Répondre aux questions suivantes en **entourant** la ou les bonnes réponses **sur le sujet**.



1. Quel est le coefficient directeur de la fonction  $f_2$  ?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| A) 3             | C) $-1,5$        |
| B) $\frac{3}{2}$ | D) $\frac{2}{3}$ |

2. Quel est le coefficient directeur de la fonction  $f_1$  ?

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| A) 2              | C) 0,5 |
| B) $-\frac{1}{2}$ | D) -2  |

3. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la fonction  $f_3$  ?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| A) 3              | C) 1,5            |
| B) $-\frac{3}{2}$ | D) $-\frac{2}{3}$ |

4. Parmi les quatre fonctions, laquelle a un coefficient directeur négatif et une ordonnée à l'origine positive ?

- |          |          |
|----------|----------|
| A) $f_1$ | C) $f_3$ |
| B) $f_2$ | D) $f_4$ |

**CORRECTION**

1. Coefficient directeur de  $f_2$  :  $\frac{2}{3}$  (rép. D).

2. Coefficient directeur de  $f_1$  :  $-\frac{1}{2}$  (rép. B).

3. Ordonnée à l'origine de  $f_3$  : 3 (rép. A).
4. Fonction à pente négative et ordonnée positive :  $f_3$  (rép. C).